

化学療法プロトコール審査結果報告書

申請診療科名 消化器外科
 申請診療科長 山本 雄造 殿
 診療科申請医師 宮澤 秀彰 殿
 申請年月日 平成26年 2月 20日

平成 26年 3月 26日

化学療法プロトコール審査委員会委員長

登録名 膀胱癌 FOLFIRINOX
 対象病名 膀胱癌
 実施場所 入院 外来

申請のありました上記がん化学療法プロトコールについて、審査の結果下記のとおりと判定いたしましたので通知いたします。

記

1. 判定結果 承認する, 条件付で承認する, 承認しない
 2. 血液毒性等

血液毒性	grade3	grade4	grade3/4	()
(好中球数減少)	[] %	[] %	[45.7] %	[] %
(発熱性好中球減少)	[] %	[] %	[5.4] %	[] %
(血小板数減少)	[] %	[] %	[9.1] %	[] %
非血液毒性	grade3	grade4	grade3/4	()
(疲労)	[] %	[] %	[23.6] %	[] %
(嘔吐)	[] %	[] %	[14.5] %	[] %
(下痢)	[] %	[] %	[12.7] %	[] %
(末梢性神経障害)	[] %	[] %	[9.0] %	[] %
(静脈炎 <u>血栓性静脈炎</u>)	[] %	[] %	[6.6] %	[] %
()	[] %	[] %	[] %	[] %
催吐リスク	<input type="checkbox"/> 高度 <input checked="" type="checkbox"/> 中等度 <input type="checkbox"/> 軽度 <input type="checkbox"/> 最小度			
制吐療法	<input checked="" type="checkbox"/> 院内ガイドラインに準拠する <input type="checkbox"/> ()			

3. 臨床使用分類

<input checked="" type="checkbox"/> 治療	エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 研究	<input type="checkbox"/> 多施設自主研究、 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究、 <input type="checkbox"/> 市販後臨床試験、 <input type="checkbox"/> その他

4. 条件の内容

5. オーダリング可能日 平成 26年 3月 26日より入力可能
 上記条件確認次第入力可能

6	薬剤名 (一般名・商品名) アロキシ デカドロン	1回投与量 (単位) 10mg 9.9mg	溶解液 (1回量) 5%ブドウ糖注射液 100mL
	1日投与回数 1回	投与方法・投与時間 点滴静注・30分	1回最大投与量 (単位) 10mg 16.5mg

※制吐剤やアレルギー予防薬等の支持療法薬剤についてもご記入下さい。

2. 投与スケジュール

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9
薬剤1 オキサリプラチン (エルプラット)	↓								
薬剤2 塩酸イリノテカン (トポテシン)	↓								
薬剤3 フルオロウラシル (5-FU)	↓								
薬剤4 フルオロウラシル (5-FU)	↓	↓	↓						
薬剤5 レボホリナートカルシウム (レボホリナート)	↓								
薬剤6 アロキシデカドロン	↓								

◎休薬期間を含めた1クールの日数 14 日

3. 添付資料

エビデンス	<input type="checkbox"/> ガイドライン、 <input checked="" type="checkbox"/> 文献、 <input type="checkbox"/> その他 ()
ガイドライン 又は、文献名	N Engl J Med 364: 1817-1825, 2011 FOLFIRINOX versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer

4. 血液毒性等

血液毒性 (好中球数減少) (発熱性好中球減少) (血小板数減少)	grade3 [] %	grade4 [] %	grade3/4 [45.7] %	() [] %
非血液毒性 (疲労) (嘔吐) (下痢) (末梢性神経障害) (静脈炎) ()	grade3 [] %	grade4 [] %	grade3/4 [23.6] % [14.5] % [12.7] % [9.0] % [6.6] % [] %	() [] % [] % [] % [] % [] % [] %
催吐リスク	<input checked="" type="checkbox"/> 高度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 最小度
制吐療法	<input checked="" type="checkbox"/> 院内ガイドラインに準拠する <input type="checkbox"/> (アロキシ+デカドロン点滴 Day 1, イメンド内腹:125m Day1, 80mg Day 2, 3、デカドロン内腹 8mg Day2, 3, 4)			