

薬品情報

No.400
2024/9/27
作成 薬品情報室

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. 新規採用医薬品一覧 | 5. 医薬品の出荷調整 |
| 2. 採用中止医薬品 | 6. 医薬品の供給再開 |
| 3. 販売名称変更医薬品 | 7. 自費ワクチンの採用 |
| 4. 医薬品の一時出荷停止 | 8. その他 |

1. 新規採用医薬品一覧

〔院内採用医薬品〕

6179:その他の主としてカビに作用するもの

<p>イサブコナゾニウム硫酸塩 Isavuconazonium Sulfate クレセンバカプセル 100mg Cresemba</p> <p>劇、処 旭化成ファーマ</p> <p>〔剤〕 硬カプセル剤 〔組〕 1 カプセル中にイサブコナゾールとして 100 mg を含有</p>	<p>〔効〕 下記の真菌症の治療 ○アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ） ○ムーコル症 ○クリプトコックス症（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））</p> <p>〔用〕 通常、成人にはイサブコナゾールとして1回 200mg を約 8 時間おきに 6 回経口投与する。6 回目投与の 12～24 時間経過後、イサブコナゾールとして1回 200mg を1日1回経口投与する。</p>	<p>〔禁〕 リトナビル、コビシスタット含有製剤、イトラコナゾール、ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リファンピシン、リファブチン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品、フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者、本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者。</p> <p>〔副〕 重大な副作用 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、肝機能障害、急性腎障害、腎不全、ショック、アナフィラキシー</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6179:その他の主としてカビに作用するもの

<p>イサブコナゾニウム硫酸塩 Isavuconazonium Sulfate クレセンバ点滴静注用 200mg Cresemba</p> <p>劇、処 旭化成ファーマ</p> <p>〔剤〕 注射剤 〔組〕 1 バイアル中にイサブコナゾールとして 212 mg を含有</p>	<p>〔効〕 下記の真菌症の治療 ○アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ） ○ムーコル症 ○クリプトコックス症（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））</p> <p>〔用〕 通常、成人にはイサブコナゾールとして1回 200mg を約 8 時間おきに 6 回、1 時間以上かけて点滴静注する。6 回目投与の 12～24 時間経過</p>	<p>〔禁〕 リトナビル、コビシスタット含有製剤、イトラコナゾール、ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リファンピシン、リファブチン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品、フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者、本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者。</p> <p>〔副〕 重大な副作用 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	後、イサブコナゾールとして1回200mgを1日1回、1時間以上かけて点滴静注する。	候群)、肝機能障害、急性腎障害、腎不全、ショック、アナフィラキシー
--	-------------------------------------------	-----------------------------------

[院外採用医薬品]

2399:他に分類されない消化器官用薬

メサラジン Mesalazine ペンタサ顆粒 94% 2000mg/包 Pentasa 処 杏林製薬 【剤】 顆粒剤 (徐放性顆粒) 【組】 2000mg 包 : 1 包に日局メサラジンを 1000mg 含有	【効】 潰瘍性大腸炎 (重症を除く)、クローン病 【用】 〈潰瘍性大腸炎〉 通常、成人にはメサラジンとして1日 1,500mg を3回に分けて食後経口投与するが、寛解期には、必要に応じて1日1回の投与とすることができる。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日 2,250mg を上限とする。ただし、活動期には、必要に応じて1日 4,000mg を2回に分けて投与することができる。通常、小児にはメサラジンとして1日 30~60mg/kg を3回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日 2,250mg を上限とする。 〈クローン病〉 通常、成人にはメサラジンとして1日 1,500mg~3,000mg を3回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜減量する。通常、小児にはメサラジンとして1日 40~60mg/kg を3回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	【禁】 重篤な腎障害のある患者、重篤な肝障害のある患者、本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者、サリチル酸エステル類又はサリチル酸塩類に対する過敏症の既往歴のある患者。 【副】 重大な副作用 間質性肺炎患、心筋炎、心膜炎、胸膜炎、間質性腎炎、ネフローゼ症候群、腎機能低下、急性腎障害、再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少症、肝炎、肝機能障害、黄疸瘵炎、中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、薬剤性過敏症症候群
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1169:その他の抗パーキンソン剤

ラサギリンメシル酸塩 Rasagiline Mesilate アジレクト錠 0.5mg Azilect 劇、処 武田薬品工業 【剤】 素錠 【組】 1 錠中にラサギリンとして 0.5mg を含有	【効】 パーキンソン病 【用】 通常、成人にはラサギリンとして 1mg を1日1回経口投与する。	【禁】 他の MAO 阻害薬 (セレギリン塩酸塩及びサフィナミドメシル酸塩) を投与中の患者、ペチジン塩酸塩含有製剤、トラマドール塩酸塩又はタペンタドール塩酸塩を投与中の患者、三環系抗うつ薬 (アミトリプチリン塩酸塩、アモキサピン、イミプラミン塩酸塩、クロミプラミン塩酸塩、ドスレピン塩酸塩、トリミプラミンマレイン酸塩、ノルトリプチリン塩酸塩及びロフェプラミン塩酸塩)、四環系抗うつ薬 (マプロチリン塩酸塩、ミアンセリン塩酸塩及びセチプチリンマレイン酸塩)、選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (フルボキサミンマレイン酸塩、パロキセチン塩酸塩水和物、セルトラリン塩酸塩及びエスシタロプラムシユウ酸塩)、セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節薬 (ボルチオキセチン臭化水素酸塩)、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (ミルナシプラン塩酸塩、デュロ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>キセチン塩酸塩及びベンラファキシン塩酸塩)、選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(アトモキセチン塩酸塩)、リスデキサメフェタミンメシル酸塩、メチルフェニデート塩酸塩、メタンフェタミン塩酸塩、マジンドール、ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ薬(ミルタザピン)、塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン、ナファゾリン硝酸塩、トラマゾリン塩酸塩又はアプラクロニジン塩酸塩を投与中の患者、中等度以上の肝機能障害(Child-Pugh 分類 B 又は C)のある患者、本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>[副] 重大な副作用</p> <p>起立性低血圧、傾眠、突発的睡眠、幻覚、衝動制御障害、セロトニン症候群、悪性症候群</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 採用中止医薬品

中止医薬品	中止理由、切替え薬品
クレメジンカプセル 200mg	製造販売中止のため
ローコール錠 20mg	フルバスタチン錠 20mg 「サワイ」に切替え
アロンアルファ A 「三共」 0.5g/本	製造販売中止のため アロンアルファスキンプロテクト(東亜合成)が代替薬であるので、医療材料での申請が必要
塩化ナトリウム注 10%シリンジ「テルモ」 20mL	塩化ナトリウム注 10% 「フソー」 (20mL/A) に切替え
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg 「F」	リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg 「日医工」に切替え

3. 販売名称変更医薬品

変更前医薬品名	変更後医薬品名
マドパー配合錠	マドパー配合錠 L100

4. 医薬品の一時出荷停止

一時出荷停止医薬品	出荷停止理由
レボトミン錠 5mg	原料の入手が困難なため

5. 医薬品の出荷調整

- ・塩化カリウム徐放錠 600mg 「St」 (アルフレッサファーマ) …製造遅延のため
- ・リパクレオン顆粒 300mg 分包 (ヴィアトリス製薬) …需要増加のため
- ・アネレム静注用 50mg (ムンディファーマ) …輸出許可遅延のため
- ・キシロカインゼリー2% 30mL/本 (サンド) …製造工程における逸脱のため
- ・ソル・コーテフ注射用 100mg/瓶 (ファイザー) …需要増加のため
- ・パルクス注 5 μ g (1mL/A) (大正製薬) …同効薬の製造遅延のため

6. 医薬品の供給再開

- ①エクラープラスター20 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ (久光製薬)
- ②テグレートル細粒 50% (サンファーマ)
- ③セファメジン α 注射用 0.5g/瓶 (LTL ファーマ)

7. 自費ワクチンの採用

- ①コミナティ筋注シリンジ 12 歳以上用 (ファイザー) : 新型コロナウイルスに対する RNA ワクチン
- ② (販売中止) プレベナー13 水性懸濁注射 (ファイザー) : 沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン
→ (代替薬) プレベナー20 水性懸濁注射 (ファイザー) : 沈降 20 価肺炎球菌結合型ワクチン

8. その他

長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養について

2024 年 10 月 1 日より、長期収載品（後発医薬品のある先発医薬品）の処方等又は調剤をする場合に医療上の必要性がある場合等を除き、通常の 1~3 割の一部負担金に加え、特別の料金を徴収することになる。また、それに伴い、長期収載品の選定療養化に伴う処方箋様式の変更が行われる。以下の内容の院内通知を別途発出しているのでご参照ください。

