

薬品情報

No. 405
2025/9/29
作成 薬品情報室

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 新規採用薬品一覧 | 5. 医薬品の供給再開 |
| 2. 採用中止薬品 | 6. 後発医薬品の変更 |
| 3. 医薬品の一時出荷停止 | 7. その他 |
| 4. 医薬品の出荷調整 | |

1. 新規採用薬品一覧

[院内採用薬品]

235:下剤、浣腸剤

| | | |
|---|---|---|
| <p>エロビキシバット水和物 Elobixibat Hydrate ゲーフィス錠 5mg Goofice</p> <p style="text-align: right;">処 EAファーマ</p> <p>[剤] フィルムコーティング錠 [組] 1錠中にエロビキシバットとして5mgを含有</p> | <p>[効] 慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）</p> <p>[用] 通常、成人にはエロビキシバットとして10mgを1日1回食前に経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、最高用量は1日15mgとする。</p> | <p>[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者、腫瘍、ヘルニア等による腸閉塞が確認されている又は疑われる患者</p> <p>[副] 重大な副作用 なし</p> |
|---|---|---|

520:漢方製剤

| | | |
|---|--|--|
| <p>大黃牡丹皮湯 Daiobotampito ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒 Tsumura Daiobotampito Extract Granules</p> <p style="text-align: right;">処 株式会社ツムラ</p> <p>[剤] 顆粒剤 [組] トウガシ、トウニン、ボタンピ、ダイオウ、ボウショウ</p> | <p>[効] 比較的体力があり、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難、便秘、痔疾</p> <p>[用] 通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。</p> | <p>[禁] なし</p> <p>[副] 重大な副作用 なし</p> |
|---|--|--|

7219:その他のX線造影剤

| | | |
|--|---|--|
| <p>イオパミドール Iopamidol イオパミロン注 370 シリンジ Iopamiron</p> <p style="text-align: right;">処 バイエル薬品</p> <p>[剤] 注射剤 [組] 1mL中に日局イオパミドールとして755.2mgを含有</p> | <p>[効] 血管心臓撮影（肺動脈撮影を含む）、大動脈撮影、選択的血管撮影、四肢血管撮影、デジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、デジタルX線撮影法による動脈性血管撮影、コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路撮影</p> <p>[用] 通常、成人1回下記量を使用する。なお、年齢、体重、症状、目的により</p> | <p>[警] ショック等の重篤な副作用があらわれることがある。本剤は尿路・血管用造影剤であり、特に高濃度製剤（370mgI/mL）については脳・脊髄腔内に投与すると重篤な副作用が発現するおそれがあるので、脳槽・脊髄造影には使用しないこと。</p> <p>[禁] ヨード又はヨード造影剤に過敏症</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>適宜増減する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む) :20~50mL ・大動脈撮影:30~50mL ・選択的血管撮影:5~40mL ・四肢血管撮影:20~50mL ・デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影:30~50mL ・デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影:3~30mL ・コンピューター断層撮影における造影:100mL 静脈性尿路撮影:20~100mL | <p>の既往歴のある患者、重篤な甲状腺疾患のある患者</p> <p>[副] 重大な副作用 (効能共通) ショック、アナフィラキシー、腎不全、急性呼吸窮迫症候群、肺水腫、意識障害、失神、血小板減少、痙攣発作、肝機能障害、黄疸、心室細動、冠動脈攣縮、皮膚障害、アレルギー反応に伴う急性冠症候群 (脳血管撮影、血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)、大動脈撮影) 造影剤脳症</p> |
|--|--|--|

[院外採用薬品]

2190: その他の循環器用薬

| | | |
|---|--|---|
| <p>マバカムテン Mavacamten カムザイオスカプセ 5mg Camzyos</p> <p style="text-align: right;">劇、処 ブリistol・マイヤーズ スクイブ</p> <p>[剤] 硬カプセル剤 [組] 5mg : 1 カプセル中にマバカムテンとして 5mgを含有</p> | <p>[効] 閉塞性肥大型心筋症</p> <p>[用] 通常、成人にはマバカムテンとして 2.5mg を 1 日 1 回経口投与から開始し、患者の状態に応じて適宜増減する。ただし、最大投与量は 1 回 15mg とする。</p> | <p>[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者、妊婦又は妊娠している可能性のある女性、イトラコナゾール、クラリスロマイシン含有製剤、ポリコナゾール、ポサコナゾール、リトナビル含有製剤、コビシスタット含有製剤、セリチニブ、エンシトレルビルフマル酸、ロナファルニブ、ジョサマイシン、ミフェプリストン・ミソプロストールを投与中の患者、重度の肝機能障害のある患者</p> <p>[副] 重大な副作用 心不全</p> |
|---|--|---|

119: その他の中枢神経系用薬

| | | |
|---|--|---|
| <p>メラトニン Melatonin メラトベル錠小児用 1mg / 2mg Beyontra</p> <p style="text-align: right;">処 ノーベルファーマ</p> <p>[剤] 素錠 [組] 1mg : 1 錠中にメラトニンとして 1mgを含有 2mg : 1 錠中にメラトニンとして 2mgを含有</p> | <p>[効] 小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善</p> <p>[用] 通常、小児にはメラトニンとして 1 日 1 回 1mg を就寝前に経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1 日 1 回 4mg を超えないこと。</p> | <p>[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者、フルボキサミンマレイン酸塩を投与中の患者</p> <p>[副] 重大な副作用 なし</p> |
|---|--|---|

<販売名称変更医薬品について>

- ・ゲムシタビン点滴静注用 200mg、1g 「ヤクルト」
→ ゲムシタビン点滴静注用 200mg、1g 「タカタ」に切替え
(株式会社ヤクルトから高田製薬へ販売移管となったため)

<オーソライズドジェネリック医薬品の採用について>

- ・クレナフィン爪外用液 10% (科研)
→ エフィナコナゾール爪外用液 10% 「科研」 (科研ファルマ) に切替え

<自費ワクチンの採用>

| 採用医薬品 | 成分名 |
|------------------------|-------------------|
| タイフィム ブイアイ注シリンジ (サノフィ) | 精製 Vi 多糖体腸チフスワクチン |

2. 採用中止薬品

当院採用の下記薬品について、採用中止と切り替え薬品は以下のようになる。

| 中止医薬品 | 中止理由、切り替え薬品 |
|---|---|
| アレギサール点眼液 0.1% (参天) | 製造販売中止のため |
| キンダベート軟膏 0.05% (GSK) | 販売中止のため → クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」 (岩城) に切替え |
| シオゾール注 10mg (高田) | 製造販売中止のため |
| デルモベートクリーム 0.05% (GSK) | 販売中止のため → クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「MYK」 (岩城) に切替え |
| デルモベートスカルプローション 0.05% (GSK) | 販売中止のため → クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05% 「イワキ」 (岩城) に切替え |
| へパリンナトリウム注 N5 千単位 5mL 「AY」 …アンプル製剤 (陽進堂) | 製造販売中止のため → へパリンナトリウム注 N5 千単位 5mL 「AY」 …バイアル製剤 (陽進堂) に切替え済み |
| リスモダン P 静注 50mg (クリニジェン) | 製造販売中止のため → アミサリン注 100mg (アルフレッサファーマ) を代替採用 |
| リボスチグミン点眼液 0.025% (参天) | 製造販売中止のため |
| 小児用フルナーゼ点鼻液 25µg56 噴霧用 (GSK) | 製造販売中止のため |

3. 医薬品の一時出荷停止

| 一時中止医薬品 | 出荷停止理由 |
|---|---|
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (吉田) | 原料調達が困難なため |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (吉田) | 原料調達が困難なため |
| アシクロビル点滴静注液 250mg 「トーワ」 (東和) | 製造ラインの一時的な稼働停止のため |
| バクトラミン注 (太陽ファルマ) | 海外製造所における製造遅延のため |
| ファモチジン注射液 10mg 「トーワ」 (東和) | 製造ラインで異物が認められたため → ガスター注射液 10mg 「LTL ファーマ」を臨時採用 |
| ファモチジン注射液 20mg 「トーワ」 (東和) | 製造ラインで異物が認められたため → ガスター注射液 20mg 「LTL ファーマ」を臨時採用 |
| メノエイドコンビパッチ 9cm ² (久光) | 一部 Lot で自主回収が生じたため |
| 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg 「タカタ」* (高田) *他社品納入を検討しておりますが、 毎月の使用本数を確保できない可能性がある | 委託製造元からの供給が困難になったため → メトクロプラミド注 10mg 「NIG」 (日医工) に切替え予定 |

| | |
|------------------------------|---|
| 乾燥弱毒性おたふくかぜワクチン「タケダ」 (武田) | 品質試験に問題が生じたため →おたふくかぜ生 ワクチン「第一三共」(第一三共)を代替採用 |
|------------------------------|---|

4. 医薬品の出荷調整

- ・ソセゴン注射液 15mg (丸石製薬) …他社製品による影響
- ・ハイキュービア 10%皮下注セット 10g/100mL (武田) …想定以上に需要が増加したため
- ・レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」 (沢井) …他社製品による影響

5. 医薬品の供給再開

(院外採用)

- ・ウロカルン錠 225mg (日本新薬)

(院内採用)

- ・アスベリン錠 20mg (ニプロ)
- ・アスベリンシロップ 0.5% (ニプロ)
- ・アスベリン散 10% (ニプロ)
- ・ジスロマック細粒小児用 10% (ファイザー)
- ・ブイフェンド 200mg 静注 (ファイザー)

6. 後発医薬品の変更

(○：採用後発医薬品)

下記採用 1 薬剤が採用メーカー変更となる。



7. その他

- ・アザシチジン注射用 150mg 「NK」 (日本化薬) の採用について

アザシチジン注射用「NK」(日本化薬)は、ビダーザ注射用(日本新薬)と生物学的同等性が確認された後発医薬品であり、切替えのためビダーザ注射用 100mg (先発品)は削除となります。

また、ビダーザ注射用 100mg は通常 1~2 本 (150mg 未満) で処方されることが多く、アザシチジン注射用 150mg 「NK」を採用することで、調製時の手間を軽減できるほか、医薬品の購入コストや患者の費用負担の削減にもつながります。

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (参考) | アザシチジン注射用 150mg 「NK」 : 17,455 円 |
| ビダーザ注射用 100mg : 21,963 円 | (アザシチジン注射用 100mg 「NK」 : 11,034 円) |